

Krankheit von Bechterew⁸

Der Backstretcher wurde eingesetzt bei einer Gruppe von 18 Patienten mit einem langwierig existierenden M. Bechterew. Diese Patientengruppe existiert seit mehr als einem Jahr und folgt einem intensiven physiotherapeutischen Programm. Durchschnittlich leiden die Patienten schon 15 Jahre an dieser Krankheit (Streuung/Verteilung 4-25 Jahre). Diese Gruppe hat ursprünglich gute Fortschritte gemacht, befindet sich jetzt aber in einer stabilen Phase, in der keine weitere Verbesserung der Beschwerden auftritt. In dieser Phase wurde der Backstretcher der existierenden Ordnung zugefügt. Während der 8 Wochen dauernden Untersuchung wurde keine additionalere Wirkung des Backstretcher wahrgenommen.

Schlußfolgerung aus dieser prospektiven Untersuchung lautet, daß der Backstretcher nicht wirksam ist, wenn eine irreversible Immobilität der Wirbelsäule aufgetreten ist. Bei HELPmedical sind aber kasuistische Erfahrungen mit Erfolg des Backstretcher bei M. Bechterew bekannt, diese positiven Erfahrungen wurden jedoch nur gemacht bei Patienten, die sich in einer frühen Phase der Krankheit befinden.

8. Onderzoek naar de effectiviteit van de Backstretcher bij patiënten met de ziekte van Bechterew; A.J. Hubers; 1996; data on file